



Mellkascsapolás

Kedves Betegünk, Tisztelt hozzátartozó!

Önnek, az elvégzett vizsgálatok alapján mellkasi folyadékgyüleme van. Kezelőorvosa mellkascsapolást tervez. A beavatkozás történhet diagnosztikus céllal, azaz annak a betegségnek a megállapítása céljából, mely Önnél mellkasi folyadékgyülemet okoz, illetve terápiás céllal, a panaszokat okozó folyadékgyülem leszívása céljából, továbbá a folyadéktermelés csökkentése, megszüntetése céljából történő gyógyszer beadás okán. A beavatkozás történhet együttesen diagnosztikus és terápiás céllal is.

A beavatkozás menete:

A beavatkozás legtöbbször ülő helyzetben, ún. lovagló ülésben történik, azonban, ha a beteg állapota ezt nem teszi lehetővé betegágyban, oldalfekvő helyzetben is kivitelezhető. A beavatkozás a mellkas bőrének fertőtlenítésével, majd helyileg érzéstelenítő injekció beadásával kezdődik. Ezt követően a beavatkozást végző orvos a folyadékgyülem határáig vezetett tű vagy vékony cső (kanül) segítségével elkezdi a folyadék leszívását. A beavatkozás végén a tűt vagy kanült a mellkasból eltávolítjuk. Nagymennyiségű, gyorsan szaporodó folyadék esetén, mellkascső bevezetése után, tartós szívás is lehetséges.

A beavatkozás alatt kérjük, lehetőleg ne beszéljen, ne mozogjon. Köhögési inger jelentkezésekor előzőekben megbeszéltek szerint jelezzen!

Lehetséges szövődmények:

A beavatkozással járhatnak különböző szövődmények, mint például a hirtelen vérnyomásesés, ideg közelsége miatt jelentkező fájdalom, kisebb vérzés, felszínes tüdősrülés következtében kialakuló légmell. Utóbbi kis mennyiség esetén önmagától felszívódik, nagyobb mennyiség esetén tartós mellkasi cső behelyezése után leszívható.

Kérjük a szövődmények lehetőségének csökkentése érdekében tájékoztassa kezelőorvosát

- esetleg meglévő gyógyszerallergiáról például jó, Lidocain, antibiotikum, köhögés csillapító
- meglévő gyógyszeres kezelésről, azaz véralvadást csökkentő, vagy egyéb véralvadást befolyásoló gyógyszerek, mint: Aspirin protect, Syncumar, Fraxiparine, Fragmin, Clexan
- illetve Ön által ismert vérzékenységről, ismert tüdő-, mellhártya-, szív-, máj- vagy daganatos betegségről.

A szakszerűség maximális betartása mellett is, bár ritkán, de előfordulhatnak a fent említett szövődmények, ellátásuk részben helyben, részben társszakmák segítségével megoldható.

Kezelő orvosa csak akkor fog Önnél mellkascsapolást javasolni, ha az elvégzendő beavatkozás kockázata kisebb, mint a vizsgálat elmaradásából adódó betegség kockázata.

Az esetleg fellépő panaszát, mint szédülés, ájulásszerű rosszullét, köhögési inger, fokozódó fájdalom, vizsgálat alatt, illetve után a lehető legrövidebb időn belül jelezze kezelőorvosának, szakápolónak, így panasz a lehető legrövidebb időn belül ellátásra kerül.

A betegtájékoztató elolvasása után felmerülő kérdéseit kezelőorvosával megbeszélheti!



Beleegyező nyilatkozat!

A beteg adatai		Korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen beteg törvényes képviselőjének (hozzátartozójának) neve:..... Személyi igazolvány száma:.....
Név		
Születés dátuma		
TAJ		

A betegtájékoztató, valamint a kezelőorvosomtól, dr.....-tól kapott részletes szóbeli felvilágosítás után a tervezett beavatkozás lényegét megértettem, a beavatkozásba

**beleegyezem*

**nem egyezem bele (annak ellenére, hogy az elutasítás esetleges egészségre káros következményeiről, felvilágosítást kaptam)*

Szekszárd,.....

.....
Beteg vagy hozzátartozó, törvényes képviselő

.....
beavatkozást végző orvos

ph.

**a megfelelő rész aláhúzendó*