

Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza
Szülészeti-Nőgyógyászati Osztály Szekszárd

BETEGTÁJÉKOZTATÓ ÉS BELEEGYZŐ LAP

/ 6. / Dokumentum címe: A méh függelékein (kürt és petefészek) végzett műtétek.

Beteg neve:..... **TAJ száma:**.....

Tisztelt betegünk !

Tájékoztatjuk Önt, hogy mielőbbi gyógyulása érdekében petefészek- petevezető műtéti beavatkozás vált szükségessé Önnél. A Szülészeti-Nőgyógyászati Osztály a beavatkozásról szeretne tájékoztatást adni, hogy—mindent mérlegelve—döntsön, és beleegyező nyilatkozatát adja a beavatkozáshoz.

A beavatkozás jellege:

A petefészek és petevezető elváltozásai a jóindulatútól a rosszindulatúig rendkívül sokszínűek, így ezek műtéti megoldásai is változatosak. Az Önt operáló orvos azért ajánlotta fel a hasa megnyitásával járó megoldást, mert a tudomány jelenlegi állása szerint így lehet az Ön petefészkének elváltozását a legtökéletesebben, a legkevesebb rizikóval ellátni. Így várható az Ön teljes gyógyulása, vagy betegségének terjedését így lehet megállítani.

A beavatkozás célja:

Műtéti törekvésünk kétirányú, attól függően, hogy jó, vagy rosszindulatúnak tűnő elváltozással állunk szembe. JÓINDULATÚ elváltozásnál az ép petefészek állományt próbáljuk megőrizni, s a lehető legkevesebbet eltávolítani belőle. Lehet a petefészek „égetése”, ék alakú kimetszése, az egyik oldali petefészek eltávolítása, a petevezetők felszabadítása, lenövések, elzáródások oldása, szájadékok megnyitása, részleges kimetszés, vagy teljes eltávolítás, esetleg a teljes függelék (petefészek + petevezető) eltávolítása. A beavatkozás mértékét mindig a műtét alatt talált elváltozás és anatómiai szituáció határozza meg.

ROSSZINDULATÚ folyamatnál, vagy annak gyanújakor annak teljes eltávolítására törekszünk. Tehát műtét közben dönthetünk úgy is, hogy mindkét oldali petefészket és a méhét is el kell távolítani.

Hogyan történik a beavatkozás ?

Az altatórvos által javasolt érzéstelenítési módban, a megfelelő előkészítést követően a várható elváltozás jellegének és az Ön adottságainak megfelelően vagy hasi középmetszésben (szeméremcsonttól a köldökig), vagy a szeméremcsont felett harántmetszést alkalmazva nyitjuk meg a hasát. A műtét kiterjesztését illetően a talált állapot szerint döntünk.

Melyek a beavatkozás esetleges szövődményei ?

A szövődmények gyakoriságát emelhetik társbetegségek, élvezeti szerek fogyasztása, túlsúlyosság, családban gyakrabban előforduló betegségek, előzményben szereplő műtétek és azok szövődményei. Ezekről feltétlenül tájékoztassa orvosát.

Méhe a petefészekkel a kismedencében helyezkedik el, mely a hasüreg legmélyebb, műtétilag nehezen megközelíthető területe. Itt szoros közelségben, néha szoros összetapadásban nagy erek, idegek, húgyhólyag, húgyvezetők és belek helyezkednek el. Ritkán, de előfordulhat olyan anatómiai elváltozás, betegség, hogy a műtét kapcsán ezek sérülnek. Ezek ellátása még a műtét alatt megtörténik. Kialakulhat olyan vérzés, mely miatt vér, illetve vérkészítmények adására is kényszerülhetünk. A has vagy a hasfal szövetei között folyadékgyülem illetve vérömleny is kialakulhat. Ennek megelőzésére illetve lebecsátására draincsövet teszünk a hasba, hasfalba és a hüvelybe. Sebfertőzés, gennyedés, vérszegénység, tartósabb ágyhoz kötöttség esetén tüdőgyulladás, vérrögösödés (trombózis, embólia) is előfordulhat, illetve ezek miatt újabb műtétre kényszerülhetünk. Az esetleges szövődmények elhárítására és gyógyítására osztályunkon a feltételek biztosítva vannak.

Műtét utáni történések:

Műtétet követően 48 órás szubintenzív megfigyelésre az őrzőszobába kerül, ahol műszerekkel vér és vizelet vizsgálatokkal követjük állapotát. Állandó vénakanüljén keresztül pótoljuk a folyadékvesztéseit, adjuk a gyógyszereket. Vizeletét minimum 24 órán át katéteren vezetjük le. Inni csak kellően éber állapotban kap, enni pedig csak kellőképpen beindult bélműködés után. A műtét után belei renyhébben működnek, ha gyógyszerekre nem reagálnak , ritkán el is záródhatnak ismételt műtétre lehet szükség. Műtét után felléphet lázas állapot, melyet

gyógyszerekkel csillapítunk. Zavartalan gyógyulás esetén kb. a 6-ik napon, varratszedést követően távozhat osztályunkról.

Várható következmények:

Műtétet követően, ha méhét és petefészket megőriztük (legalább az egyik oldalon) és még aktív korban van, menstruálni fog, teherbeesési és kihordási esélyeiről tájékoztatni fogjuk. Eleinte hasi fájdalmai lesznek, melyeket csillapítunk. Idővel ezek enyhülnek, szűnnek. Kisebb-nagyobb letapadások alakulhatnak ki a hasában, melyek időszakos „csipkelődéssel”, járnak. Szexuális élete nem fog változni.

Milyen alternatív megoldás lehetséges ?

Ezen műtéti típust az előzőekben már említettük, azért választottuk Önnek, mert a kockázat-haszon határon belül ez a legelőnyösebb. A következőkben megemlítünk még olyan megoldásokat, melyek esetleg szóba jöhetnek, mi azonban azért nem ezeket választottuk, mert vagy nem teljes megoldást jelentenek az Ön esetében, vagy nagyobb kockázattal járhatnak. Ezek: a petefészek elváltozás célzott leszívása, laparoszko-pos beavatkozás, vagy csak gyógyszeres kezelés.

Mi a teendő beavatkozás után ?

A műtét kapcsán eltávolított szöveteket szövettani vizsgálatra küldjük, ennek eredménye után a megbeszélte időpontban érdeklődjön. Távozása után családorvosát keresse fel. Műtétet követően hat hét múlva ,vagy jelentősebb panasz kialakulása esetén bármikor, - kontroll vizsgálatra jelentkezzen. A kontroll vizsgálatig kímélő életmód, nemi élet tilalom javasolt.

A műtét elmaradásának következményei:

Tisztelt betegünk ! Tudjuk, hogy bizonyos szövödmények rémítően hatnak, de döntését a műtéti beleegyezésbe az vezérelje, hogy az Ön gyógyulása, életkilátásainak javítása érdekében történik minden, sokkal nagyobb haszon, mint a kockázat. Amennyiben műtétjét nem végezhetjük el, a petefészkeink, petevezetőjén olyan anatómiai és működésbeli elváltozások jelentkehetnek, melyek az Ön esetleges teherbeesési esélyeit rontják, vagy a menstruációs ciklusait felborítják. Állandó fájdalmai léphetnek fel, melyek bizonyos idő után csillapíthatatlanná válhatnak. Jóindulatú térfoglaló folyamatok növekedésével, vagy az elváltozás rosszindulatú elfajulásával életkilátásai az idő előrehaladtával csökkennek.

Beleegyző nyilatkozat:

A petefészek, illetve a petevezető műtéti beavatkozásról a tájékoztatót elolvastam, az orvos általi szóbeli tájékoztatást megértettem, az általam feltett kérdésekre megnyugtató, kielégítő válaszokat kaptam, a beavatkozás elvégzésébe beleegyezem, kérem annak elvégzését.

.....
a felvilágosítást végző személy beteg/törvényes képviselő aláírása
Szekszárd.....év.....hó.....nap.....óraperc

Elutasító nyilatkozat:

A kezelőorvos részletes felvilágosítása, - mely a beavatkozás elmaradása esetén előforduló következményeket is tartalmazta—ellenére a beavatkozás elvégzését megtagadom.

.....
a felvilágosítást végző személy beteg/törvényes képviselő aláírása
.....
tanú aláírása tanú aláírása

Szekszárd:.....év.....hó.....nap.....óraperc