

BETEGTÁJÉKOZTATÓ ÉS BELEEGYZŐ LAP

/2./ Dokumentum címe: Curettage (Méhkaparás)

Beteg neve:..... TAJ száma:.....

Tisztelt betegünk!

Tájékoztatjuk Önt, hogy mielőbbi gyógyulása érdekében curettage műtéti beavatkozás vált szükségessé. A Szülészeti-Nőgyógyászati osztály a beavatkozásról szeretne tájékoztatást adni, hogy-mindent mérlegelve-döntson, és beleegyező nyilatkozatát adja a beavatkozáshoz.

A beavatkozás jellege:

Hüvelyi, nőgyógyászati, szülészeti, diagnosztikus és terápiás jellegű beavatkozás.

A beavatkozás célja:

Diagnosztikus esetekben szöveti minta nyérése a méh nyálkahártyájáról. Terápiás célja a méhszájban, méhtestben lévő polyp eltávolítása, abortusz után visszamaradt szövetrészek eltávolítása, vérzés megszüntetése a túltengett nyálkahártya eltávolításával.

Hogyan történik a beavatkozás?

A beavatkozást az altató orvos által kiválasztott érzéstelenítési módban végezzük. A méhszáj kifogása után szondával megmérjük a méhüreg hosszát. Hegar eszközzel méhnyak tágítást végzünk, majd curettage kanállal a méhnyálkahártyát lekaparjuk. Fractionalt (szakaszos) curettage esetén külön távolítjuk el a méhnyakból és a méhtestből lekapart anyagot, szövettani feldolgozásra küldjük.

Melyek a beavatkozás esetleges szövődményei?

A szövődmények gyakoriságát emelhetik bizonyos alapbetegségek, élvezeti szerek fogyasztása, túlsúlyosság, családban gyakrabban előforduló betegségek, előzményben szereplő műtétek és azok szövődményei. Ezekről feltétlenül tájékoztassa orvosát. Előfordulhat a méh sérülése (pl.: perforációja), amely után hasmútét válhat szükségessé. A sérülés jellege lehet olyan is, hogy méheltávolítást kell végezni, vagy bélműtétet. A méhkaparás után gyulladás is kialakulhat.

Műtét utáni történések:

Műtét után a beteget megfigyeljük, majd amennyiben panaszmentes, még aznap távozhat az osztályról.

Várható következmények:

Műtét után enyhe hasi görcsök, valamint kevés vérzés lehetséges, s ez normális. Gyulladás, láz esetén antibiotikus kezelés szükséges, ezért panasz esetén azonnal forduljon orvoshoz.

Milyen alternatív megoldás lehetséges?

Jelenleg alternatív megoldás nincs.

Mi a teendő a beavatkozás után?

Távoztása után Családorvosánál jelentkeznie kell. Pár napig kímélő életmód. Kórszöveti eredményének megérkezése után annak milyensége a további teendőket meghatározza. Műtéttől számított 4-6 hét múlva normál menzesse várható, ekkor kontroll vizsgálatra jelentkezzen. Ha menzesse már nincs 6 hét múlva kontroll.

A műtét elmaradásának következményei:

Fennálló panaszainak (pl. vérzés, láz) fokozódása, a nyálkahártya rosszindulatúvá való elfajulása, vagy a meglévő rosszindulatú daganat végzetessé, gyógyíthatatlanná válása.

Beleegyező nyilatkozat

A méhkaparás műtéti beavatkozásról a tájékoztatót elolvastam, az orvos általi szóbeli tájékoztatót megértettem, az általam feltett kérdésekre megnyugtató, kielégítő válaszokat kaptam, a beavatkozás elvégzésébe beleegyezem, kérem annak elvégzését.

.....
a felvilágosítást végző személy

.....
beteg/törvényes képviselő aláírása

Szekszárd,év.....hó.....nap

Elutasító nyilatkozat

A kezelőorvos részletes felvilágosítása - amely a beavatkozás elmaradása esetén előforduló következményeket is tartalmazta - ellenére a beavatkozás elvégzését megtagadom.

.....
a felvilágosítást végző személy

.....
beteg/törvényes képviselő aláírása

Szekszárdév.....hó.....nap