

Betegtájékoztató, beleegyező nyilatkozat hasnyálmirigy, epeutak endoszkópos vizsgálata (ERCP) során

Tisztelt Betegünk!

Ez a vizsgálat lehetővé teszi, hogy az orvos felismerjen egyes betegségeket, melyek a hasnyálmirigyet és/vagy az epeutakat érintik. Bizonyos gyógyító beavatkozások is elvégezhetőek ezen eljárás során pl.: epeútkó eltávolítás, epeút áttisztítás, epe-vezeték kezdeti szakaszának bemetszése, stb ...

A vizsgálat alatt a garat helyi érzéstelenítését követően eleinte bal oldal, majd hasonfekvő helyzetben egy vékony, hajlékony optikai műszert (endoszkópot) vezetünk a szájon át és a garaton keresztül a nyelcsőbe, és onnan tovább a gyomorba és a mélynyombélbe. Itt felkeressük az ún. papillát, ahol a közös epe- és a hasnyálmirigy-vezeték együtt nyílik a nyombélbe. Ebbe vékony hajlékony katétert vezetünk, melyen keresztül (jód tartalmú - kérjük jód-érzékenységet jelezzé - röntgen kontrasztanyagot juttatunk a vizsgált szervekbe, és rtg. készülék segítségével nézzük, annak eloszlását. A garat érzéstelenítése Lidocain spray-vel történik kérjük jelezzé, ha érzékeny rá, azt is ha Syncumart és/vagy más vérhígító gyógyszert szed, vagy pacemakert visel, továbbá azt is, ha szívbillentyűműtéten esett át, vagy egyéb szívbillentyű-betegségben szenved! A vizsgálat a légzést nem zavarja, nem jár fájdalommal. Kérjük ezen időszak alatt az orrán keresztül vegye a levegőt és a szájában keletkezett nyálát ne nyelje vissza, mindent engedjen kicsorogni a szája elé helyezett pelenkába. A vizsgálat előtt Glucagon és Seduxen inj.-t kap a bélmozgás leállítására és, hogy Ön ellazuljon.

A vizsgálat után fél óráig nem étkezhet, nem fogyaszthat folyadékot, mert a garatérzéstelenítés miatt megnő a félrenyelés veszélye. Az első étkezés időpontja egyes esetekben módosulhat, e tekintetben is kövesse kezelőorvosa utasítását! Ha a hasnyálmirigy-vezeték is telődött a vizsgálat napján csak teát fogyasszon!

A tükrözés, tapasztalt orvosok esetén szövődménymentes, de igen ritkán előfordulhatnak szövődmények: az érzéstelenítőszer vagy a nyugtató injekció iránti túlérzékenység, a műszer okozta sérülés, s bizonyos esetekben steril hasnyálmirigy-gyulladás alakulhat ki. Ezek a szövődmények azonban nem gyakoriak. Szerencsétlen körülmények egyidejű fennállása esetén súlyosabb szövődmény is kialakulhat, ami akár műtéti eljárást von maga után (pl. a papilla bemetszése során vérzés, illetve perforáció keletkezhet).

Ha a vizsgálat után görcsös hasi fájdalom lépne fel, vagy fekete székletet észlelné, jelezze kezelőorvosának!

A betegtájékoztató és az ezt kiegészítő szóbeli tájékoztatás után a javasolt endoszkópos vizsgálatba beleegyezem:

Név: _____

TAJ: _____

Szekszárd, _____

Beteg