

**Előírás**  
**Nyilatkozat I-131 izotóppal kezelt beteg részére**

Szekszárd, ..... év ..... hó .... nap

	<b>Beadott I-131 aktivitása</b>	
	<b>&lt; 250 MBq</b>	<b>250-550 MBq</b>
1. Tömegközlekedést	<b>igénybe vehet</b>	<b>nem vehet igénybe</b> 4 napig
2. Más személyhez 1 m-nél közelebb ne tartózkodjon huzamosabb ideig	2 napig	4 napig
3. Nem tartózkodhat egy helyiségben gyermekkel és terhesekkel	7 napig	14 napig
4. Amennyiben közös háztartásban 35 évesnél fiatalabb személy él, külön WC-t kell a beteg számára biztosítani	3 napig	5 napig
5. Legyen fokozott figyelemmel az alábbi higiéniai követelményekre: a.) férfiak is ülve használják a toalettet, b.) WC használat után gondosan mosson kezet, c.) WC használat után a WC-t 2-3-szor öblítse le	7 napig	14 napig
6. Igyon bőven folyadékot		
7. Használjon külön ágyneműt, ezt és a fehérneműjét mossák külön	7 napig	7 napig
8. Használjon külön evőeszközt	7 napig	7 napig
9. Leghamarabb munkába állhat	2 nap múlva	4 nap múlva

**Figyelmeztetés:**

1. Mi lehet a radiojód kezelést követő esetleges korai szövődmény?
  - a.) a pajzsmirigy duzzadás – esetleges fájdalom,
  - b.) pajzsmirigy fokozott működése tüneteinek átmeneti rosszabbodása
2. Mi lehet a radiojód kezelés esetleges késői szövődménye?
  - a.) pajzsmirigy csökkent működés
3. Terhesség és szülést követő szoptatás ideje alatt a radiojód kezelés elvégzése szigorúan tilos! Radiojód terápia után fél éven belül nem ajánlott a terhesség, és amennyiben ez bekövetkezne, azt kezelőorvosával azonnal tudassa.

Fenti előírásokat magamra nézve kötelezőnek ismerem el és a kezelésbe beleegyezem:

kezelőorvos

a beteg aláírása